

Proteja a su bebé de la SÍFILIS



PROTEJA A SU FAMILIA



HABLE

Visite a su médico y pregúntele sobre la prueba de sífilis.



HÁGASE LA PRUEBA

Hágase la prueba en su primera consulta prenatal y, si está en riesgo, también hágasela en el tercer trimestre y al momento del parto.

¡PREGUNTE CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS!



TRÁTESE

Si le diagnostican sífilis, hágase tratar de inmediato.


Asegúrese de que su pareja también reciba tratamiento.

INFÓRMESE SOBRE LOS PELIGROS

ES POSIBLE QUE SU BEBÉ SEA
CIEGO
SORDO
PREMATURO

EVITE
LA MUERTE
LA MENINGITIS
LA ANEMIA
EL BAJO PESO AL NACER

En los últimos 4 años, los casos de sífilis congénita han **AUMENTADO MÁS DEL DOBLE.**



Probabilidad de que una madre le transmita sífilis al feto si no se hace la prueba ni recibe tratamiento:

80%*

Llame al 311 o visite healthychicagobabies.org



Adaptado y modificado con la autorización del Departamento de Salud de Nueva Jersey. *Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de